

イナズマS

稲の初期生育に活力！
硫黄(S)欠乏症による
初期生育抑制対策に！



正味：5kg

販売 JAグループ
農業協同組合



製造 KCC 片倉コープアグリ株式会社


その症状 **硫黄欠乏** かも!?

移植から30～40日後、
田んぼにこんな症状ありませんか?

① 茎数が
増えない

② 草丈が
伸びない

③ 下の葉が
黄化する



生育不良の
原因は

硫黄(S)欠乏
かもしれません!

硫黄(S)はチッソ(N)・リン酸(P)・カリ(K)と
同じく植物の成長に欠かせない必須多量元素。
Nとともに、含硫アミノ酸としてタンパク質
を構成しており、不足すると葉の黄化や生育
不良の原因に。

硫黄欠はこれで対策!

育苗箱施用の省力資材!

イナズマS

●イナズマSの分析例(%)

カルシウム	水溶性カルシウム	硫黄	水分	pH
28.5	26.3	17.0	0.6	5.1

※水溶性カルシウムは、現物1gに水500mLを加え抽出し測定。

育苗箱施用でらくらく硫黄補給!

【育苗箱施用の施用量目安】

1箱あたり約250g (5kg/10a)

※10aあたり苗箱20枚を使用する場合の施肥量です。疎植・高密度播種等で
苗箱のご使用枚数が少ない場合は適宜調節してご使用ください。

【施用時期】

定植の10日前～移植直前

本田施用には普通粒で散布しやすい
「畑のカルシウム」をご使用ください

【本田施用量の目安】

40～60kg (2～3袋)/10a

【施用時期】

基肥(代掻き前) または 追肥(症状発生後速やかに)

※施用量は圃場条件により異なります。詳しいことはお近くのJAにお問合せ下さい。



育苗箱施用の作業風景



畑のカルシウム基肥施用での生育状況
定植37日後の株の状態
(左:60kg/10a施用区 右:無施用区)