

有機農産物JAS表A.1 適合の資材

ソイルサプリー®エクス

特殊肥料



荷姿

20kg / 箱

6kg×3本 / 箱

1.2kg×10本 / 箱

※地域によっては取り扱いのない荷姿もあります。



含有成分							当社分析例
チッソ	リン酸	カリ	有機酸	腐植 (腐植酸+フルボ酸)	遊離アミノ酸	全糖	pH
3%前後	1%前後	1%前後	約3%	約5%	約3.5%	約12%	4前後

※含有アミノ酸はプロリン、アラニン、グルタミン酸、アスパラギン酸、グリシン、リジン 他

供給



JAグループ

製造



片倉コープアグリ株式会社

<http://www.katakuraco-op.com>

土壌の活力を高め、生産性の高い地力作りに!!

特 長

- ◎「大麦・麹菌・酵母」のみで熟成された高機能のアミノ酸・有機酸濃縮液です。
- ◎ 100%有機質由来の特殊肥料で、有機農産物の日本農林規格(有機JAS規格)に適合する資材です。
- ◎ トミー液肥との混用により、更に効果を発揮します。

【使用方法】

水稻



【育苗期】

- 1) 播種時、灌水時「**2,000倍希釈**」
- 2) 硬化期以降、灌水時「**200倍希釈**」

【水口流し込み】

中干し後の最初の取水時

直播栽培は移植栽培の中干し想定時期

- 1) 水口閉める ⇒ 2) 取水 ⇒ 3) **ソイル4L/10a流し込み**

ダイズ



【耕起・播種前(土壌散布)】

使用量:「**1～2L/10a**」(**希釈液80～100L/10a想定**)

【種子塗布処理】

・ダイズ種子に、「**2mL/種子1kg 塗布**」

【生育期(作物へ葉面散布)】

・葉面散布、「**300倍希釈/10a**」(**開花期おススメ**)
(希釈液80～100L/10a想定)

コムギ



【耕起・播種前(土壌散布)】

使用量:「**1～2L/10a**」(**希釈液80～100L/10a想定**)

【生育期】

・葉面散布、「**300倍希釈/10a**」
(希釈液80～100L/10a想定)

【使用上の注意】

- 1) 上記、「希釈倍率」「使用量」は原則守ってお使いください。
濃く」施用した場合、**機械詰まりの原因になります。**
- 2) アルカリ剤との混用は避けてください。
- 3) 有機100%ですので冷暗所(日の当たらない場所)で保管してください。